

Influence du mode de soins sous contrainte sur la prise en charge et l'orientation diagnostique d'un patient au profil héboïdophrène, lors d'un premier contact psychiatrique.

Présentation des résultats

Fédération Régionale de Recherche en Santé Mentale

Dr DECOU Frédéric

Directrice de mémoire : Dr AMELLER Aurély

04 dec 2012

Héboïdophrénie

Forme périphérique de schizophrénie

(Lanteri-Laura)

Présentation anti-sociale au 1^{er} plan

Contexte de l'étude

- Impression d'une différence de prise en charge pour un patient au profil héboïdophrène, selon le mode de soins sous contrainte
- Pas d'étude similaire dans la Littérature

Méthodologie

Etude exploratoire basée sur un questionnaire portant sur
un cas clinique

Méthodologie (1)

- Hypothèse principale :
 - Le mode de soins sous contrainte influence la prise en charge des patients au profil héboïdophrène
- Hypothèse secondaire :
 - Le mode de soins sous contrainte influence l'orientation diagnostique des patients au profil héboïdophrène

Méthodologie (2)

- 3 questionnaires :
 - Un même cas clinique
 - S.D.R.E. carcéral
 - S.P.D.T.
 - S.P.I.

Méthodologie (3)

- Paramètres évaluant la prise en charge
- Paramètres évaluant l'orientation diagnostique

Méthodologie (4)

- Population étudiée :
 - Internes de psychiatrie du Nord-Pas-de-Calais
 - Psychiatres thésés du Nord-Pas-de-Calais

Résultats et discussion

Présentation des **principaux** résultats

Résultats et discussion (1)


- Taux de réponse « internes de psychiatrie » : 62%
- Taux de réponses « psychiatres thésés » : 15%

Résultats et discussion (2)


- Hypothèse principale (influence du mode de soins sous contrainte sur la prise en charge) est confirmée pour certains paramètres
- Hypothèse secondaire (influence du mode de soins sous contrainte sur l'orientation diagnostique) est confirmée pour un paramètre

Les psychiatres thésés proposent significativement plus la chambre d'isolement pour un patient au profil héboïdophrène en S.D.R.E. carcéral

Proposition du questionnaire « utilisation de la chambre d'isolement » avant le 1^{er} entretien




Proposition du questionnaire « chambre d'isolement » comme lieu de 1^{er} entretien




Les internes de psychiatrie proposent significativement plus la chambre d'isolement pour un patient au profil héboïdophrène en S.D.R.E. Carcéral

Proposition du questionnaire « utilisation de la chambre d'isolement » avant le 1^{er} entretien




Proposition du questionnaire « chambre d'isolement » comme lieu de 1^{er} entretien




Les internes de psychiatrie proposent significativement moins le relais avec le secteur pour un patient au profil héboïdophrène en S.D.R.E. carcéral

Proposition du questionnaire « relais avec le secteur »



Les **psychiatres thésés** proposent significativement moins le diagnostic de « possible entrée dans la schizophrénie » pour un patient au profil héboïdophrène en S.D.R.E. carcéral

Proposition diagnostique du questionnaire « 1^{er} épisode psychotique d'une possible entrée dans la schizophrénie »



Conclusion

- Plusieurs traits de représentation associés au type de mode de soins sous contrainte
- Influence de ces représentations dans le cadre de la prise en charge d'un patient au profil héboïdophrène
- Influence globale de nos représentations sur nos prises en charge et orientations diagnostiques

Merci de votre attention