

...
...
...
... will get
... forget u
...
... I love y



Goodbye.


Epidémiologie- suicide

1. Dans le monde

- 800 000 suicides /an.
- 1 suicide toutes les 40 secondes

Epidémiologie- suicide

2. Niveau européen



Source : Heidi (Health in Europe: Information and Data Interface)


France = 6^{ème} rang

Epidémiologie-suicide

- 1^{ère} cause de mort évitable en France : 10 314 DC en 2011 (*CepiDC INSERM*)
- 1^{ère} cause de Décès entre 25 et 35 ans
- 200 000 TS médicalisée. 40% de récurrence
- 10% des sujets ayant fait une TS finissent un jour par se suicider.


Epidémiologie- suicide

3. Sur le plan national



Source : Insee-CerDD - Fait avec Piblaris

Carte 1. Les hommes



Source : Insee-CerDD - Fait avec Piblaris


Carte 2. Les femmes

Taux standardisés de mortalité par suicide par région, en France, pour 100 000 habitants. 2000-2008

Nord pas de calais, 4^{ème} région la plus touchée en France

Epidémiologie- suicide

4. Niveau Régional



Carte 3. Indices comparatifs de mortalité par suicide par secteur de psychiatrie adulte, dans le Nord - Pas-de-calais. 2000-2008.

Crise Suicidaire

la perspective d'une
vie différente



Mort

80% des personnes qui se sont suicidées ont consulté leur Médecin Traitant la semaine précédant leur mort.

Facteurs de risque suicidaire

ATCD personnel TS
Pathologie psychiatrique
Faible estime de soi
Tempérament et style cognitif
Maladie somatique incurable
Sexe masculin,
Âge jeune ou élevé
Iatrogénie, toxicomanie

Facteurs de risques personnels

Difficultés financières,
Isolement socio-professionnel,
Conflits familiaux,
Problématiques judiciaires
Difficultés dans le développement
« Contagion » suite à un suicide

Evènements de vie

SUICIDE

Facteurs de risques familiaux

ATCD familiaux de suicides
Violence, abus physiques ou
psychologiques ou sexuels

Absence de facteurs de protection

Faible résilience
Absence de soutien


Critères d'urgence et de dangerosité

- **souffrance** psychique
- Degré **d'intentionnalité**
- tension psychique, agitation.
- Existence d'un facteur **précipitant**
- **Dangerosité** et **accessibilité** du moyen létal considéré

PREVENTION

PRIMAIRE	SECONDAIRE	TERTIAIRE
Prévenir le geste avant qu'il ne se produise	Soins d'urgence	Soins à long terme
Campagnes d'information/prévention	PEC crise suicidaire	Eviter les récurrences
Repérer groupes à risque	Formation professionnels de santé et bénévoles	Programmes de soins spécifiques

Rôle des médias : Effets Werther et Papageno



VS



Développement du Programme Papageno



Prévoir et prévenir un suicide, est l'affaire de tous!

Journée de la F2RSM

17/11/16



Audrey FONTAINE, Interne
Présidente de l'ALI2P