

# Évaluation du traitement médiatique du suicide dans la presse écrite française

J. MANCHON<sup>1</sup>, S. VERZAUX<sup>2</sup>, CE. NOTREDAME<sup>1,3,4</sup>

1. Pôle de Psychiatrie, Médecine Légale et Médecine Pénitentiaire, CHU de Lille // 2. Service de Psychiatrie Infanto-Juvenile, CH de Douai // 3. Laboratoire SCALab UMR CNRS 9193  
4. Fédération Régionale de Recherche en Psychiatrie et Santé Mentale Hauts-de-France, Lille

## Introduction


La couverture médiatique d'un fait suicidaire est susceptible d'influencer le taux de suicide par le biais d'un effet incitateur nommé « effet Werther » (EW) (1) et d'un effet préventif nommé « effet Papageno » (EP) (2). En 2008, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a émis des recommandations (3) dans le but d'améliorer la qualité du contenu médiatique dont dépend l'EW et l'EP. Bien qu'il s'agisse d'un facteur déterminant pour estimer l'ampleur de ces effets, aucune évaluation de la conformité de la presse écrite aux recommandations de l'OMS n'a encore été menée en France.

## Objectif

Évaluer la qualité du traitement médiatique des faits divers suicidaires en termes de risque d'EW et de potentiel d'EP dans la presse écrite française.

## Méthode

1) Constitution d'un échantillon d'articles de presse parus en 2014



2) Analyse de l'échantillon : évaluation de chaque article via la grille « PrESS » (4) qui permet de mesurer le degré de conformité aux recommandations de l'OMS, par deux juges préalablement entraînés à l'utilisation de cette grille

## Résultats

Figure 1 et 2. Distribution des scores Werther et Papageno




Figure 3. Proportion de satisfaction des critères Werther




Figure 4. Proportion de satisfaction des critères Papageno




Figure 5. Score en fonction du type de fait suicidaire




Figure 6. Score en fonction de la célébrité du suicidant




Figure 7. Score en fonction du nombre de mots




Figure 8. Score en fonction du moyen suicidaire





Figure 9. Score en fonction du mois de l'année



## Conclusion

Le risque d'EW était élevé et le potentiel d'EP faible dans la presse écrite Française. La faible qualité du traitement médiatique du suicide justifie la mise en place d'interventions visant à limiter l'EW et à promouvoir l'EP, comme le fait le programme Papageno depuis 2015. Des pistes de travail ont été dégagées afin de mieux orienter les actions de santé publique à mettre en œuvre en partenariat avec les journalistes.

## Bibliographie

- Pirkis J, Blood RW. Suicide and the news and information media. A critical review. Mind Frame Media. 2010 Feb.
- Niederkröthaler T, Voracek M, Herberth A, Till B, Strauss M, Etzersdorfer E, et al. Role of media reports in completed and prevented suicide: Werther v. Papageno effects. Br J Psychiatry. 2010 Sep 1; 197(3):234-43.
- World Health Organization. Preventing Suicide. A Resource for Media Professionals. WHO Press. Geneva, Switzerland; 2008.
- Verzaux S, Notredame CE, Vaiva G. Validation d'une grille d'évaluation qualitative d'articles de presse écrite sur le suicide, dans le cadre du projet Papageno. Mémoire de DES de Psychiatrie ; Lille, 2015.

Programme Papageno - F2RSM Psy Hauts-de-France

3, rue Malpart - 59000 Lille - Tél 03 20 44 10 34 - www.papageno-suicide.com

contact : papageno@f2rsmpsy.fr - Directeur : Dr Thierry Danel

@PapagenoSuicide