

F2RSM Psy

Fédération régionale de recherche
en psychiatrie et santé mentale Hauts-de-France

Statut du dépistage organisé des cancers dans une population présentant des « troubles psychiques graves »

C. Billau¹, C-L. Charrel^{2,3}, S. Duhem^{3,4}, L. Plancke³, L. Defromont²

¹ Médecin généraliste, en exercice libéral

² EPSM Lille-Métropole, Armentières

³ Fédération Régionale de Recherche en Psychiatrie et Santé Mentale Hauts-de-France, Lille

⁴ Pôle de Psychiatrie, Médecine Légale et Médecine pénitentiaire, CHU de Lille

Contexte

Dépister tôt pour mieux soigner, la médecine préventive en matière de cancer constitue un enjeu important de santé publique, tout particulièrement chez les patients fragiles suivis en psychiatrie. Alors que les résultats des dépistages organisés des cancers ont tendance à stagner dans la population générale, l'objectif de l'étude est d'évaluer la participation aux dépistages organisés des cancers du sein et du colon chez des patients présentant des troubles psychiques graves.

Méthode

Une enquête transversale quantitative par questionnaire portant sur la réalisation d'un test immunologique de dépistage pour le cancer colorectal et d'une mammographie de moins de 2 ans, proposé par le professionnel référant, aux patients âgés de 50 à 74 ans présentant des troubles psychiques graves, diagnostiqués au sein d'un secteur psychiatrique de la banlieue sud-est de Lille, sur la période de novembre 2017 à fin janvier 2018.

Résultats

Le taux de participation au dépistage du cancer du sein par mammographie observé sur la population de l'étude est de 65,2% (n=58) statistiquement plus important que dans la population générale des 6 communes concernées 52,85% (p<0,05). Le taux de participation au dépistage du cancer colorectal par test immunologique observé sur la population de l'étude est de 34,4% (n=54) statistiquement plus important que dans la population générale 26,75% (p<0,05). Le fait d'avoir réalisé une mammographie était associé avec la réalisation du test immunologique de façon statistiquement significative (p=0,02). Concernant le suivi somatique, la totalité des patients interrogés (n=157) avaient un médecin traitant déclaré, 96,18% (n=151) l'ont consulté au cours des 6 derniers mois, ce qui est une recommandation de bonne pratique chez les patients atteints de pathologie mentale sévère.




Figure 1. Répartition de la population étudiée en fonction de la pathologie (n=157)

■ Nombre de patients




Figure 2. Mammographie à jour pour les femmes dans la population étudiée (n=89) et dans la population générale du même secteur psychiatrique

■ Mammographie à jour
■ Dépistage non à jour

Figure 3. Test immunologique à jour dans la population étudiée (n=157) et dans la population générale du même secteur psychiatrique





Figure 4. Les freins au dépistage organisé (n=89)



Conclusion

Ces résultats encourageants ne doivent pas occulter que les taux restent largement inférieurs aux objectifs européens fixés respectivement à 70% et 45% d'autant que le nombre important de perdus de vue et le fonctionnement singulier du service rendent difficile l'extrapolation des résultats. En effet la pratique de ce service donne une place centrale au médecin traitant en le laissant seul prescripteur des traitements médicamenteux. La collaboration forte avec celui-ci semble avoir joué un rôle considérable sur les taux de dépistage retrouvés. Les cancers du sein et du colon restent très meurtriers, des essais cliniques randomisés de qualité et d'envergure sont nécessaires en matière de dépistage.

Références bibliographiques

- Howard LM, Barley EA, Davies E, Rigg A, Lempp H, Rose D, et al. Cancer diagnosis in people with severe mental illness: practical and ethical issues. *Lancet Oncol.* 1 août 2010;11(8):797-804.
- Charrel C-L, Plancke L, Genin M, Defromont L, Ducrocq F, Vaiva G, et al. Mortality of people suffering from mental illness: a study of a cohort of patients hospitalised in psychiatry in the north of France. *Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol.* févr 2015;50(2):269-77.
- Ruggeri M, Leese M, Thornicroft G, Bisoffi G, Tansella M. Definition and prevalence of severe and persistent mental illness. *Br J Psychiatry J Ment Sci.* août 2000;177:149-55.
- Defromont L., Verriest O., Dudenko P. *Revue Hospitalière de France - Les médecins généralistes au coeur de la santé mentale* [Internet]. [cité 20 mars 2018]. Disponible sur: <http://www.revue-hospitaliere.fr/Revue/547/Psychiatrie-sante-mentale-et-territoires/Les-medecins-generalistes-au-coeur-de-la-sante-mentale>

Fédération Régionale de Recherche en Psychiatrie et Santé Mentale Hauts-de-France

3, rue Malpart - 59000 Lille - France - Tél 03 20 44 10 34 - Fax 03 20 13 73 02 - www.f2rsmpsy.fr

contact : communication@f2rsmpsy.fr - Directeur : Dr Thierry Danel

@F2RSM Psy