
#### Dépression post-natale paternelle

JOURNEE SCIENTIFIQUE F2RSM PSY

19 OCTOBRE 2023







### Introduction

- La période périnatale est un **état de vulnérabilité chez les deux parents** même en l'absence de facteurs de risques reconnus
- Importants bouleversements physiques, psychiques, sociaux pouvant conduire à l'apparition ou l'aggravation de troubles psychiatriques
- La dépression post-natale (DPN) peut ainsi survenir chez les pères durant la première année suivant la naissance
- Importance du dépistage et de la prise en charge en raison des conséquences sur le père lui-même, le développement du bébé, la relation de couple et le bien être de la partenaire



### Prévalence

- Peu d'études ont été réalisées sur la DPN paternelle, recherches essentiellement centrées sur la mère et l'enfant
- Nombre limité de sujets avec des conclusions difficilement généralisables
- Prévalence de la DPN paternelle estimée à 10,4 % à la fois en pré et post-partum (méta-analyse 43 études, Paulson et Bazemore)



# Evaluation psychométrique

- La DPN paternelle est avant tout un diagnostic clinique
- Peu d'outils validés
- Utilisation de l'EPDS :
  - Seuil de 10 à 12 pour la DPN paternelle



# Evolution de le DPN paternelle

- La DPN paternelle se développe de <u>façon progressive</u> tout au long de la première année
- Les hommes sont moins déprimés que les femmes pendant la grossesse et en post-partum immédiat
- Pic de DPN paternelle entre 3 et 6 mois après la naissance (25,6 %) et un taux le plus bas lors des 3 premiers mois (7,7 %).
- La dépression paternelle en période prénatale peut se prolonger dans le postpartum : 50 % des pères déprimés pendant la grossesse le sont encore 8 semaines après la naissance



### Chiffres sous-évalués

- La santé mentale paternelle sous-étudiée
- Peu d'outils spécifiques valides
- Sujet tabou:
  - 54% des pères n'osent pas en parler
  - 5% ressentent de la honte
  - 3 pères sur 4 se sentent culpabilisés par les attentes sociétales



# Présentation clinique

• Les symptômes dépressifs : moins apparents, installation progressive, difficiles à

dépister

#### • Symptômes psychiques :

- retrait social
- indécision, peur importante, attaques de panique
- rigidité et irritabilité
- désintérêt pour le bébé et fuite dans le travail
- consommation d'alcool et de drogues
- conflits conjugaux et violence envers la partenaire

#### • Symptômes somatiques:

- changement d'appétit, prise ou perte de poids, diarrhée, constipation, nausées
- céphalées, insomnies





#### Comorbidité

- Les études sur ce sujet restent rares
- Existence d'une comorbidité élevée entre dépression et <u>troubles</u>
  <u>anxieux</u>: jusqu'à 18 % vivent une expérience anxiogène
- Développement ou aggravation d'un trouble obsessionnel compulsif
- Parfois **pensées intrusives** et **phobies d'impulsion** vis-à-vis de l'enfant, **difficiles à dévoiler**
- Association possible avec PTSD (naissance difficile)



### Etiologie et facteurs de risque





## Facteurs de risques biologiques

• Baisse du taux de **testostérone** pendant la grossesse et le postpartum



## Facteurs de risque psychologiques

- Les antécédents personnels de dépression, scores élevés de dépression ou d'anxiété en anténatal
- Le neuroticisme, l'abus de drogues et d'alcool, la dépendance
- Modifications de la relation de couple: perte d'intimité, dysfonctionnements conjugaux
- Une grossesse inattendue, perte d'un enfant lors d'une précédente grossesse, difficultés de l'enfant (problèmes de santé)



## Facteurs de risque maternels

- La DPN maternelle un <u>facteur de risque principal</u> de la dépression paternelle autant en période prénatale que post-natale
- La DPN parmi les nouveaux pères dont la partenaire souffre de DPN se situe entre 24 et 50 % contre 1,2 et 25,5 % en population générale
- Les pères ayant une partenaire déprimée en postpartum ont **2,5 fois plus de risque** d'être déprimés 6 semaines après la naissance
- La PEC de la DPN maternelle doit inclure le père +++





### Facteurs de risques sociétaux

- La place, le rôle et le statut du père dans la société changent en même temps que des stéréotypes perdurent:
  - la maladie mentale est associée à un signe de faiblesse et l'homme devrait pouvoir régler lui-même ses problèmes
  - Le père est censé être fort, stoïque et soutenir sa femme et son bébé
  - S'occuper du bébé est le rôle naturel de la femme



#### Du pater familias aux « nouveaux pères » (années 80)






#### Avènement du « papa poule »









Aujourd'hui le modèle du père aimant, affectueux et présent pour ses enfants s'impose







DÉPARTEMENT DE PSYCHOLOGIE

√I FACULTÉ



#### Evolution de la loi qui retire progressivement au père son omnipotence

- 4 juin 1970, la toute-puissance du « chef de famille », devient « l'autorité parentale », exercée par les deux parents
- 22 juillet 1987, principe de « coparentalité ».
- **8 janvier 1993**, enfant a le droit d'être élevé par ses deux parents
- 4 mars 2002, permet la résidence alternée
- 1 Juillet 2021, congé paternité à 28 j
- 1 Juillet 2022, loi relative au choix du nom issu de la filiation



### Transformations profondes de la famille et changement de la place des femmes dans la société






#### L'ère du babyarcat?



22

#### Des rôles moins bien différenciés



2008 2016

#### Une société de performance à l'origine de pressions parentales



#### Prévention de la DPN Paternelle

- Depuis 2015, l'<u>OMS</u> recommande une meilleure intégration des hommes au suivi de la grossesse
- <u>Nécessaire d'impliquer et soutenir les pères</u> dans toutes les étapes de l'arrivée de l'enfant:
  - Préparation à la naissance: groupes de paroles spécifiques entre pères
  - Accouchement : césarienne+++, importance du peau à peau
  - Retour à la maison: participation du père aux soins du bébé
- Importance du congé de paternité (28 j depuis juillet 2021).
- Importance de l'information et formation des professionnels
- Importance de l'information des pères (EPP, Internet, dépliants...)



## Prise en charge de la DPN Paternelle

- Bénéfice des thérapies psychologiques et des traitements pharmacologiques (AD), à confirmer par des études
- Prise en charge de la triade quand la mère souffre de DPN +++



### Conclusion

- Même si la société change, persistance du stéréotype idéalisé du mâle solide et dominant
- Il est important de s'intéresser à la santé mentale du père pendant le postpartum et de former les professionnels de santé à reconnaitre les premiers signes de la DPN paternelle +++
- La DPN paternelle diffère de la DPN maternelle : les symptômes se développent de manière plus progressive et sont plus difficiles à diagnostiquer
- La bonne santé des pères est primordiale dans le développement de leur enfant



#### Merci de votre attention!











